

ОТРАВЛЕНИЯ


В трёх случаях может появиться подозрение, что ребёнок отравился: 1. Предположение, что он случайно съел лекарственный препарат. 2. Местное раздражение, сопровождающееся появлением болей. 3. Внезапные изменения в состоянии или поведении ребёнка.

В число симптомов отравления входят такие, как тошнота, рвота, острая боль в желудке, очень сухой рот, синие губы, необычный запах при дыхании, медленные или убыстрённые удары сердца, сильное потоотделение, дрожь, шатающаяся походка, диарея, расширение или сужение зрачков, возбуждение, галлюцинации, судороги. Крайней степенью отравления является развитие комы с потерей сознания.

Прежде всего следует выяснить, какое вещество и в каком количестве съел ребёнок. Если имеются остатки препарата, принятого ребёнком, или сохранилась его упаковка, их необходимо захватить с собой для последующей передачи медицинским работникам. Желательно установить точное время, когда произошёл несчастный случай.

Это позволит предположить продолжительность скрытого периода и время максимального действия яда. Важно помнить, что все случаи внезапного ухудшения состояния ребёнка на фоне полного здоровья, не сопровождающиеся признаками острого воспалительного заболевания, должны вызвать





подозрение на отравление. Особенно это справедливо при неожиданных расстройствах сознания и судорогах у детей.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

Прежде всего следует позвонить в «скорую», а до её приезда надо как можно быстрее вызвать рвоту.

Именно это является основной доврачебной помощью при острых отравлениях у детей. Проще всего вызвать рвоту рефлекторным раздражением корня языка ребёнка. Рвоту также можно вызвать, если дать ребёнку концентрированный тёплый раствор соды (2-4 ч. л. на раствор тёплой воды). Как рвотное средство можно использовать порошок горчицы (1-2 ч. л. на раствор тёплой воды).

Назначения таких рвотных средств или рефлекторный вызов рвоты противопоказан при отравлениях бензином, керосином, скипидаром, сильными кислотами или щелочами, фенолом, крезолом и другими агрессивными веществами,

повреждающими слизистые оболочки желудка.

Рвоту ни в коем случае нельзя вызывать у детей с расстройством сознания из-за опасности попадания рвотных масс в дыхательные пути. Если «скорая»

ещё к этому времени не подъехала, то для промывания желудка необходимо давать ребёнку тёплый неконцентрированный раствор соды (1 ч. л. на стакан воды), чуть розовую «марганцовку» или даже просто чистую воду, а затем вызывать у него рвоту. Промывание желудка проводится до чистых

промывных вод, когда после получения рвоты рвотные массы не содержат ничего, кроме чистой жидкости. Общий объём жидкости для промывания не должен превышать 2 л. По окончании промывания желудка следует дать ребёнку активированный уголь из расчёта 1 грамм на килограмм веса ребёнка, т.е. 15-50 граммов.

<http://detsaodnani.ru>