Как распознать коклюш у ребенка

Диагноз «коклюш» у ребенка ставят все чаще. Заболеваемость коклюшем продолжает расти. В числе главных причин роста заболеваемости – отказ родителей от вакцинации детей, несоблюдение сроков вакцинации, снижение уровня прививочного иммунитета населения. Коклюш – острая бактериальная инфекция. Источник инфекции-больной человек. Передача возбудителя происходит при разговоре, крике, плаче, кашле, чихании.

Инкубационный период от 7 до 21 дня. Коклюш начинается как обычная простуда – сухой навязчивый кашель возникает чаще ночью или перед сном.

Катаральный период продолжается 10-14 дней. Постепенно усиливается кашель, приобретая приступообразный характер. Приступообразный

Кашель – главный симптом коклюшной инфекции. Чистота приступов достигает до 30 раз в сутки и более. У некоторых детей при приступах кашля возникает рвота. Частый симптом – небольшая отечность лица, век.

Как обезопасить ребенка от заболевания коклюша

1. Своевременно прививать ребенка от коклюша.
2. Всегда обращаться к врачу при проявлении кашля. Если распознать коклюш на раннем этапе, то врач успеет принять меры, которые облегчат лечение болезни и снизят вероятность осложнений.

Если ребенок заболел

1. Изолируйте заболевшего.
2. Свежий воздух главное лекарство при коклюше (избегайте при этом общения с другими людьми).
3. Проветривайте и увлажняйте воздух в комнате.
4. Оградите ребенка от табачного дыма.
5. Кормите чаще и меньшими порциями, пища не должна требовать усиленного жевания.
6. Удерживайте ребенка от активных игр, физическая нагрузка может вызвать приступы кашля.
7. Ежедневно проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.